

NIEUWSBRIEF SCHAPEN

In deze nieuwsbrief:

Mededelingen vanuit de
praktijk

[Pagina 1](#)

Schapencongres Sevilla

[Pagina 2](#)

Omweidingssysteem

[Pagina 2](#)

Myasis (maden)

[Pagina 3](#)


Mest-abonnement

[Pagina 3](#)



WEIDESEIZOEN

Het lammerseizoen ligt inmiddels achter ons en de meeste dieren lopen weer buiten. Wat zijn aandachtspunten in het voorjaar? Controleer de wormbesmetting van uw koppel door middel van mestonderzoek. Controleer ook de conditie van uw schapen na het scheren en behandel uw schapen met Klik pour-on over de rug ter preventie van myasis. Over beide onderwerpen leest u meer op pagina 3. Veel leesplezier!



Schapencongres Sevilla

Van 6 tot 10 maart heeft onze dierenarts Rianne van Helden namens De Herkauwerspraktijk deelgenomen aan het 10e Internationale Schapen Congres. Dit vond plaats in Sevilla, Spanje. 600 schapendierenartsen uit 40 verschillende landen kwamen hier bijeen voor het vergaren van nieuwe kennis. Ook Rianne heeft veel opgestoken op dit congres. De belangrijkste lezingen heeft ze samengevat in het vakblad Het Schaap editie april 2023. Als u hierin interesse heeft, kunt u het daar nalezen. Natuurlijk zal ze de opgedane kennis ook in de praktijk brengen en zult u beslist eens horen wat ze daar allemaal geleerd heeft.



De opening van het congres in de grote zaal



Een gedeelte van de Nederlandse delegatie

Omweidingsstelsysteem

Het is goed om na te denken over een praktisch omweidingsstelsysteem. Verdeel een perceel bijvoorbeeld in 3 tot 4 kleinere percelen en gebruik deze afwisselend. Er zijn vele voordelen, namelijk:

- Behoudt van een dichte zode, doordat het gras na beweiding weer goed kan opkomen.
- Niet beweidde percelen kunnen gemaaid worden in de periode dat het gras hard groeit (mei/juni).
- Omdat de dieren vaker op een nieuw perceel komen, is de infectiedruk lager waardoor de kans op een wormbesmetting kleiner is.
- Mocht uit mestonderzoek blijken dat ontwormen nodig is, dan kunnen de dieren na het ontwormen naar een 'schoon' land. Dit is een weide waar de afgelopen 3 maanden geen schapen op hebben gelopen.
- Door een korte verblijftijd op het perceel zijn de schapen weg voordat de wormeieren tot besmettelijke larven zijn ontwikkeld (maximaal 2 weken in de zomer).
- Niet te lang, jong gras zorgt voor een maximale opname.



Myasis (maden)

Helaas is myiasis voor de meeste schapenhouders geen onbekend probleem. De aandoening komt jaarlijks bij 2-5% van de schapen en lammeren voor van **april tot oktober**. Myiasis begint vaak bij dieren die diarree hebben waardoor de vacht vies is. Voor de groene vlieg is dit een aantrekkelijke plek om eitjes te leggen die zich binnen 2 dagen ontwikkelen tot larven. Deze richten binnen enkele uren beschadigingen aan de huid aan. Meestal zien we het in de vacht rond de staart. Een enkele keer gebeurt het bij langdurige regenval in de zomer waardoor ook broeierige plekken onder de wol op de rug ontstaan. De maden voeden zich met vrijgekomen weefselvocht, huid en onderliggend weefsel, waardoor ernstige wonden kunnen ontstaan. **Binnen 48 uur hebben de maden zich door de huid heen gegeten en gaan ze het lichaam van het schaap binnen.** Als de maden de tijd krijgen om zich verder te ontwikkelen ontstaan er veel nieuwe vliegen uit de eitjes die gelegd zijn door die ene vlieg.

SYMPTOMEN: Het schaap zondert zich af, kwispelt met de staart en bijt zich op de plaats waar de larven zich bevinden. In een later stadium wordt het schaap sloom en gaat hij dood. Als je er op tijd bij bent vallen vaak eerst de natte, stinkende plekken in de vacht op. De vacht is hier dan ook zeer makkelijk los te trekken en de maden zijn dan zichtbaar.

BEHANDELING: Het behandelen van myiasis kan door de plek ruim te scheren en te ontsmetten. Vaak is een behandeling met antibiotica nodig, omdat er sprake is van een wondinfectie. Daarnaast moet het schaap behandeld worden met een middel dat de maden dood. Vraag advies aan uw dierenarts om zeker te weten dat u het juiste middel gebruikt.

Voorkómen is het sleutelwoord!

- **Op tijd scheren en voorkómen van diarree**
- **De schapen over de rug behandelen met **Clik pour-on** na het scheren**
Dit biedt 4 maanden bescherming tegen myiasis.

Mest-abonnement

Het is belangrijk om regelmatig mestonderzoek uit te laten voeren. Het meest beducht zijn we op dit moment voor de voorjaarsworm *Nematodirus battus*. De verschijnselen van deze worm zijn diarree en enorme dorst bij de lammeren. De symptomen lijken erg op die van coccidiose, maar de behandeling is anders. Door middel van mestonderzoek kunnen we het verschil aantonen en de ernst ervan. Om de wormbesmetting in uw koppel gedurende het jaar te monitoren, bieden wij u het mest-abonnement aan. U krijgt hiermee een bedrijfsspecifiek advies wat betreft de behandeling van wormen bij uw schapen. Meer informatie hierover vindt u op onze website of stel uw vragen gerust aan een van onze dierenartsen. Wij verzoeken u om de mestmonsters voor 12.00 uur aan te leveren.

